



Prevención de Parvovirus en perros y gatos

El **parvovirus canino**, que se propaga por todo el mundo, causa una infección vírica muy contagiosa, en perros y gatos. Si no se trata, la enfermedad infecciosa, también llamada parvovirus canino, puede ser mortal.

El parvovirus, también llamado peste canina, está causado por el parvovirus canino (CPV). Sin embargo, el virus no es peligroso para los humanos. Se trata de una infección gastrointestinal grave que se acompaña de fiebre alta, vómitos y diarrea. El virus ataca principalmente el intestino delgado, las células de la médula ósea y las células linfáticas del timo y el bazo.

En Green Disinfection recomendamos la desinfección periódica de las cajas de arena de perros o gatos e incluso dar a nuestras mascotas un disparo de **EXMICROR®** en su agua de bebida, ya que es un producto 100% biológico y no tóxico. Los parvovirus son muy resistentes y pueden sobrevivir en el medio ambiente hasta 6 meses. Sobreviven a un rango de pH de 3 a 11 y a temperaturas de hasta 70 grados.

Los parvovirus se transmiten a través de las heces de los animales infectados, los objetos contaminados o los alimentos.

La excreción del virus en las heces comienza con el asentamiento y la multiplicación del virus en las criptas intestinales unos 3-7 días después de la infección. Un perro infectado puede contagiar a otros animales cuando aún no presenta síntomas de la enfermedad. Los perros con esta infección gastrointestinal son contagiosos durante unos 14 días, lo que significa que excreta el virus en las heces durante unas dos semanas. El periodo de incubación de los parvovirus es de 7 a 14 días, lo que significa que: desde el momento del contacto con un perro infectado hasta el brote clínico de la enfermedad, transcurren aproximadamente 7-14 días.

El parvovirus es especialmente peligroso para los cachorros, ya que la madre puede infectar también a los cachorros no nacidos. Los recién nacidos, en cambio, están bien protegidos por los anticuerpos maternos. Sin embargo, esta protección se desvanece al cabo de unas semanas, mientras que su propia inmunidad aún no se ha creado. Por lo tanto, los cachorros y los animales jóvenes corren un riesgo especial de contraer parvovirus.

Desgraciadamente, no existe ningún medicamento específico y eficaz contra los parvovirus. Por lo tanto, el veterinario administrará antibióticos de amplio espectro para evitar la propagación de las bacterias. Los parvovirus se extienden por todo el mundo y son muy resistentes. Afortunadamente, existe una protección eficaz contra los virus: la vacunación y el uso de **EXMICROR®**.



green
DISINFECTION

Los parvovirus son especialmente peligrosos por su resistencia.

EXMICROR® pudo demostrar en una prueba de laboratorio su eficacia contra los parvovirus.

